



Revisión

Desinfectantes de superficies utilizados en el ámbito sanitario

Isabel Romero Crespo^{a,*}, Maria Luisa Gaspar Carreño^b y Maria Cristina Muñoz Contreras^c

^a Proyectos y Servicios Asistenciales, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, Valencia, España

^b Servicio de Farmacia, Hospital Intermutual de Levante, Valencia, España

^c Servicio de Farmacia, Hospital HLA La Vega, Murcia, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 5 de julio de 2024

Aceptado el 17 de marzo de 2025

On-line el 17 de septiembre de 2025

Palabras clave:

Desinfectante de superficies

Biocida

Ámbito sanitario

Producto sanitario

Eficacia

Modo de empleo

R E S U M E N

Objetivo: Revisar los aspectos más relevantes a considerar para seleccionar el desinfectante de superficies óptimo para su uso en el ámbito sanitario.

Método: La revisión se realizó durante un periodo de 3 meses (de enero a marzo de 2024) a partir de la relación de los desinfectantes de superficies de ámbito sanitario autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y en periodo de transición, con la comercialización permitida hasta su inscripción en el Registro Oficial de Biocidas. Se excluyeron aquellos agentes biocidas pertenecientes a las categorías de antisépticos para piel sana y repelentes de insectos. Se seleccionaron un total de 100 agentes biocidas, que se distribuyeron entre 4 investigadores de manera equitativa. La estrategia de revisión consistió en realizar una consulta a los responsables de la comercialización de dichos productos a través de e-mail o bien, consultando sus fichas técnicas a través de sus páginas web. Los aspectos revisados de cada uno de los desinfectantes fueron: presentaciones comercializadas, eficacia declarada, composición, indicación, dosificación y modo de empleo.

Resultados: El número total de agentes biocidas incluidos en el estudio fue de 85. Se consultó a un total de 29 proveedores con un total de 141 presentaciones comercializadas, 25 (29,41%) de ellas estériles. En relación a la eficacia declarada por el proveedor, el 100% (85 productos) presentaban actividad bactericida, el 81,18% (69) fungicida, el 78,82% (67) virucida, el 50,59% (43) levuricida, 20% (17) micobactericida/tuberculicida y el 17,65% (15) actividad esporicida. En cuanto al modo de empleo, 40 de los 85 biocidas (47,06%) se presentaban en un formato de dosificación listo para usar y 34 (40%) permitían aunar limpieza y desinfección en un solo paso. Un total de 14 biocidas (16,47%) contemplaban la desinfección por vía aérea.

Conclusiones: La selección del desinfectante de superficies más adecuado no es sencilla, dada la amplia gama de productos comercializados, el número de aspectos a considerar y que no todos ellos cumplen todos los aspectos. Por este motivo, es necesario acompañar el proceso de selección de la implementación de programas optimizados destinados a reducir la transmisión de patógenos desde las superficies a los pacientes y al personal sanitario.

© 2025 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (S.E.F.H). Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Surface disinfectants used in healthcare environments

A B S T R A C T

Objective: Review the most relevant aspects to consider when selecting the optimal surface disinfectant for use in healthcare settings.

Method: The review was conducted over a three-month period (January to March 2024) based on the list of healthcare surface disinfectants authorized by the Spanish Agency of Medicines and Medical Devices and those in a transitional period, with marketing allowed until their registration in the Official Biocide Register. Biocidal agents belonging to the categories of skin antiseptics and insect repellents were excluded. A total of 100 biocidal agents were selected and evenly distributed among four researchers. The review strategy involved consulting the marketing representatives of these products via email or by reviewing their technical datasheets on their respective websites. The reviewed aspects of each disinfectant included marketed presentations, declared efficacy, composition, indication, dosage, and usage instructions.

Results: The total number of biocidal agents included in the study was 85. A total of 29 suppliers were consulted, covering 141 marketed presentations, 25 (29.41%) of which were sterile. Regarding the efficacy declared by

Keywords:

Surface disinfectant

Biocide

Healthcare environment

Medical device

Efficacy

Instruction for use

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: romerocrespo@gmail.com (I. Romero Crespo).

suppliers, 100% (85 products) showed bactericidal activity, 81.18% (69) fungicidal activity, 78.82% (67) virucidal activity, 50.59% (43) yeasticidal activity, 20% (17) mycobactericidal/tuberculocidal activity, and 17.65% (15) sporocidal activity. In terms of usage instructions, 40 of the 85 biocides (47.06%) were presented in a ready-to-use dosage format, and 34 (40%) allowed for cleaning and disinfection in a single step. A total of 14 biocides (16.47%) included airborne disinfection options.

Conclusions: Selecting the most appropriate surface disinfectant is not straightforward, given the wide range of marketed products, the number of factors to consider, and the fact that not all products meet every criterion. For this reason, the selection process must be accompanied by the implementation of optimized programs aimed at reducing the transmission of pathogens from surfaces to patients and healthcare personnel

© 2025 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (S.E.F.H). This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Informes recientes proporcionan evidencia de que los ambientes sanitarios contaminados representan un factor de riesgo importante para la colonización e infección de pacientes con patógenos multirresistentes¹⁻⁵. Los microorganismos tienen propiedades gracias a las cuales pueden sobrevivir en condiciones desfavorables, desde unos pocos días hasta varios meses. Las bacterias, virus y hongos pueden transmitirse desde superficies inanimadas a la piel del paciente y del personal sanitario. Por este motivo, es necesario tener en cuenta que superficies inanimadas visualmente limpias pueden ser una fuente importante de patógenos. Se ha demostrado que una mejor limpieza y desinfección de las superficies reduce la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria que pueden ser adquiridas por pacientes, visitantes y trabajadores sanitarios⁶.

Los desinfectantes de superficies de ámbito sanitario se enmarcan en la categoría de biocidas. Los biocidas son sustancias o mezclas de

sustancias activas cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica. Están regulados por el Reglamento de la Unión Europea (UE) no. 528/2012⁷ y se dividen en 4 grandes grupos y 22 tipos de producto en función de sus indicaciones de uso (fig. 1). Los desinfectantes de superficies de ámbito sanitario están categorizados como tipo de producto 2, en adelante, TP2.

La autorización de biocidas requiere que las sustancias activas que contienen estén aprobadas o en proceso de aprobación (periodo transitorio) para el tipo de producto del que se trate a nivel de la Unión Europea (UE). En caso de estar aprobadas, el Reglamento no. 528/2012 de biocidas contempla los procedimientos de autorización que se muestran en la tabla 1, mientras que en el caso de que se encuentren en periodo transitorio, aplica la legislación nacional, que, en el caso de España, son el Real Decreto 3349/1983⁸ y Real Decreto 1054/2002⁹.




Figura 1. Grupos y tipos de biocidas según Anexo V del Reglamento (UE) no. 528/2012.

Tabla 1
Principales características sobre cada tipo de autorización

	Autorización simplificada	Autorización nacional	Autorización de la unión
<i>Solicitud</i>	ECHA	AC EM	ECHA
<i>Tramitación</i>	AC EM	AC EM	AC EM
<i>Resolución</i>	AC EM	AC EM	Comisión Europea
<i>¿Qué sustancias activas se permiten?</i>	Anexo I reglamento de biocidas	Todas	No todas (ver cuáles están excluidas de la norma)
<i>Plazos de resolución</i>	90 días	365 días	356 + 180 días
<i>¿Qué hacer para la comercialización en otros Estados Miembros?</i>	Notificar como mínimos 30 días antelación y adecuar las etiquetas a la lengua de cada estado	Se debe realizar un reconocimiento mutuo sucesivo o en paralelo	No es necesaria la notificación, ya que esta autorización es válida en toda la UE

AC EM: Autoridad Competente del Estado Miembro; ECHA: European Chemicals Agency; UE: Unión europea.

Actualmente, el listado de desinfectantes de ámbito sanitario TP2 autorizados en España se puede consultar en la página web de la AEMPS¹⁰, mientras que los que se encuentran en periodo transitorio se pueden consultar en la página web del Ministerio de Sanidad¹¹.

La amplia variedad de desinfectantes disponibles y la ausencia de bases de datos públicas con información concentrada y accesible relacionada con las características de los desinfectantes de superficies autorizados, dificulta la selección del desinfectante de superficies idóneo.

Si a nivel general queremos resaltar la importancia de la adecuada desinfección en el ámbito sanitario¹², entendiéndose esta como el procedimiento que destruye, en mayor o menor grado, las formas de microorganismos metabólicamente activas, aunque no las esporas bacterianas, en este proceso han contribuido a la mejora los avances en el desarrollo de desinfectantes apropiados al entorno clínico, persiguiendo las características ideales comúnmente aceptadas: amplio espectro antimicrobiano, velocidad de acción rápida y efecto remanente mantenido, método de aplicación sencillo y factible en el ámbito asistencial, compatibilidad con superficies y materiales, ausencia de toxicidad y efectos irritativos mínimos y bajo impacto medioambiental.

En cuanto a la preparación de medicamentos en hospitales, las buenas prácticas de preparación de medicamentos son la parte de la garantía de calidad para asegurar que se realiza de acuerdo con unas normas de calidad apropiadas con el fin último de proteger al paciente.

La Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria (GBPP)¹³ es el referente a seguir para asignar los períodos de validez microbiológicos según el nivel de riesgo a las preparaciones estériles elaboradas en un servicio de farmacia hospitalaria (SF).

El material y los utensilios necesarios para la preparación de medicamentos debe estar almacenado en la zona de preparación, de modo que solo se utilicen para tal fin. Debe asegurarse su limpieza y desinfección tras cada uso para evitar la contaminación cruzada con otras preparaciones.

Los agentes de limpieza y desinfección deben estar libres de microorganismos viables, y los que se utilizan en las salas de grado A y B deben ser estériles y estar libres de esporas.

Cuando no se dispone de salas blancas o se elaboran lotes superiores a 25 unidades¹⁴, o bien se asignan períodos de validez superiores a los establecidos por la GBPP según el nivel de riesgo, se debe realizar el correspondiente control microbiológico de las preparaciones elaboradas.

Para que los controles microbiológicos tengan validez es imprescindible que todas las manipulaciones de muestras y pruebas de esterilidad se realicen bajo condiciones asépticas, por personal cualificado, en equipos certificados (campanas de flujo laminar, salas blancas), con los controles microbiológicos ambientales necesarios y utilizando los estándares apropiados.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar lo crucial que es la desinfección del área quirúrgica, por ser el quirófano, el entorno en el que se realizan intervenciones que pueden involucrar equipos e instrumentos quirúrgicos y que deben someterse a una limpieza y desinfección exhaustivas de forma diaria, incluso si no ha sido utilizado

durante el día. La esterilización de las superficies, el mobiliario y el instrumental clínico, son pasos esenciales para prevenir infecciones¹⁵ y complicaciones posoperatorias. Para la desinfección, es crucial usar desinfectantes con concentraciones que aseguren la eliminación de microorganismos sin dañar el entorno quirúrgico.

En este sentido, el objetivo de esta revisión es describir detalladamente la eficacia, composición, dosificación y el modo de empleo de los desinfectantes de ámbito sanitario TP2 autorizados para facilitar su selección.

Métodos

La estrategia de revisión consistió en consultar las fichas técnicas de todos los desinfectantes de superficies de ámbito sanitario autorizados, solicitándolas vía e-mail a los responsables de su comercialización o bien, consultando la información a partir de sus páginas web.

Criterios de inclusión: desinfectantes de superficies de ámbito sanitario TP2 autorizados y en periodo transitorio; desinfectantes de superficies ámbito sanitario autorizados por la AEMPS; desinfectantes de superficies ámbito sanitario con eficacia virucida demostrada, autorizados por la AEMPS; productos biocidas de ámbito sanitario TP2 con comercialización permitida hasta su inscripción en el Registro Oficial de Biocidas (en periodo transitorio).

Criterios de exclusión: se excluyeron los agentes biocidas en periodo transitorio pertenecientes a los tipos de productos TP1 y TP19, por no ser objeto de esta revisión.

El proceso de selección de los productos biocidas se refleja en la [fig. 2](#).

Una vez seleccionados los productos biocidas a incluir en la revisión, se asignaron a un equipo formado por 4 investigadores de manera equitativa. De esta forma, y a partir de la información contenida en la ficha técnica del producto biocida, se recopilaron las siguientes variables de cada uno de ellos: presentación comercializada, eficacia declarada, composición, dosificación, indicación, y modo de empleo. Las variables se seleccionaron teniendo en cuenta el estudio de Rutala y Weber¹⁶, cuyos autores evalúan los aspectos claves a considerar en la elección del desinfectante hospitalario más adecuado para las superficies ambientales ([tabla 2](#)).

El periodo de consulta se realizó durante 3 meses. Al finalizar el mismo, los 4 investigadores pusieron en común los resultados elaborando un único documento de revisión.

Resultados

Una vez seleccionados los 100 productos biocidas a incluir en el estudio, según el procedimiento detallado en la figura 2, se procedió a recopilar la información de las variables objeto de la revisión en 2 tablas: [tabla 3](#), conteniendo los desinfectantes de superficies del ámbito sanitario autorizados por la AEMPS, incluidos los de eficacia virucida demostrada; y [tabla 4](#), con los productos biocidas con comercialización permitida hasta su inscripción en el Registro Oficial de Biocidas.

Se excluyeron 10 biocidas de la [tabla 3](#), quedando así un total de 58 referencias; 9 de ellos se excluyeron por estar descatálogos y uno por




Figura 2. Proceso de selección de productos biocidas de ámbito sanitario (TP2).

estar actualmente registrado como producto sanitario clase IIa. De la tabla 4 se excluyeron 5 biocidas, dando como resultado 27 referencias; 3 por estar registrados solo para su uso en la industria alimentaria y 2 por estar revocados/anulados por la AEMPS. El número total de biocidas finalmente analizados, fue de 85 (inicialmente y finalmente se incluyeron 100, aunque posteriormente hubiera que excluir 15 por diversos motivos).

Se consultó a un total de 29 proveedores con un total de 141 presentaciones comercializadas. Del total de presentaciones, 25 (29,41%) se comercializaban estériles, 12 de ellas en relación con el envase y 13 en cuanto a envase y contenido.

Con relación a la eficacia declarada por el proveedor, el 100% (85) presentaba actividad bactericida, el 81,18% (69) fungicida, el 78,82% (67) virucida, 11 de los cuales reivindicaban eficacia virucida total, el 50,59% (43) levuricida, 20% (17) micobactericida/tuberculicida y el 17,65% (15) esporicida.

En cuanto al modo de empleo, 40 de los 85 biocidas revisados (47,06%) se presentaban en un formato de dosificación listo para usar y 34 (40%) permitían aunar limpieza y desinfección en un solo paso.

Un total de 14 productos (16,47%) presentaban indicación en la desinfección de superficies vía aérea, 10 de ellos como indicación en

exclusiva y los 4 restantes como indicación adicional a la desinfección por contacto.

Discusión

En relación con la eficacia declarada por el fabricante, Rutala y Weber¹⁶ postulan la necesidad de conocer los principales microorganismos causantes de infecciones y brotes hospitalarios en nuestro entorno, de modo que la eficacia de nuestro desinfectante esté ensayada directamente para tales microorganismos concretos. Sin embargo, puesto esto no siempre es viable, al menos se cubrirá el espectro de bacterias vegetativas que han demostrado causar un mayor número de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (79,1%) son: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus coagulans*, *negativus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella*, *Enterobacter*^{17,18}.

A la hora de evaluar la eficacia declarada por el fabricante, es importante tener en cuenta las normas europeas obligatorias y las adicionales (marcadas con asterisco) que se requieren según el tipo de desinfección, la localización y el germen a eliminar y que se detallan a continuación^{19,20}:

Tabla 2

Consideraciones clave a la hora de seleccionar el desinfectante óptimo

Consideraciones clave a la hora de seleccionar el desinfectante óptimo		Puntuación (del 1 al 10)
Consideración	Preguntas	
<i>Eficacia declarada</i>	El producto elimina los patógenos más relevantes incluyendo aquellos que causan más infecciones nosocomiales, causan más brotes o son más problemáticos en su centro	
<i>Tiempos de eficacia y de contacto</i>	¿Qué tan rápido elimina el producto a los patógenos más prevalentes?	
<i>Seguridad</i>	¿Las superficies tratadas se mantienen visiblemente húmedas durante los tiempos de eficacia reivindicados en el etiquetado?	
	¿Tiene el producto una clasificación de toxicidad aceptable?	
	¿Tiene el producto una clasificación de inflamabilidad aceptable?	
	¿Requiere un nivel mínimo de protección personal?	
<i>Facilidad de uso</i>	¿Es compatible con las superficies más comunes de su centro?	
	¿Es aceptable el olor del producto?	
	¿Tiene una caducidad aceptable?	
	¿El formato del producto se adapta a las necesidades de su instalación?	
	¿Es eficaz en presencia de materia orgánica?	
	¿Es soluble en agua?	
	¿Limpia y desinfecta en un solo paso?	
<i>Otros factores</i>	¿Las instrucciones de uso son sencillas y claras?	
	¿El proveedor proporciona formación continua tanto presencial como virtual?	
	¿El proveedor ofrece soporte 24 h/7 d?	
	¿Es aceptable el coste total del producto?	
	¿El producto puede ayudar a estandarizar los productos utilizados en su centro?	

Rutala WA y Weber DJ (2014).

Considere las 5 categorías propuestas, otorgue a cada producto una puntuación del 1 al 10 para cada uno de los 5 aspectos considerados y seleccione el producto con la puntuación total más alta (puntuación máxima: 50).

Tabla 3
Desinfectantes de superficies del ámbito sanitario autorizados por la AEMIPS

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
A & B laboratorios de biotecnología, S.A.	DD 445 (garrafa 5 l)	844-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecildimetilamonio 7%, - Isopropanol 7,10%, alcohol alquílico etoxilado, aminas, N-C12–14 (números pares) - Alquiltrimetilendi- - Productos de reacción con ácido cloroacético, etalonamina, monoclhidrato de polihexametilbiguanida (PHMB): 0,50% - Peróxido de hidrógeno 5% - Plata 0,005%	Dilución: Bactericida: 3% 5 min Fungicida: 3% 15 min Virucida: 4% 30 min	Detergente desinfectante concentrado de superficies ámbito sanitario	Diluir según eficacia requerida respetando los tiempos de contacto. No precisa aclarado
Aplicaciones técnicas sanosil S.L.	Sanosil S010 HC (pulverizador 1litro, garrafa 10 l)	987-DES	-	-	Bactericida Fungicida Levuricida Virucida limitada Esporicida		Listo para usar	Desinfección de superficies por contacto y vía aérea y eliminación de moho	Desinfección por contacto: Humedecer un paño limpio (bayeta aséptica) o mopa con el producto y aplicar en la superficie a tratar dejando que la película húmeda se seque. Deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas antes de su utilización. Dosis aprox. (suelos) 8–10 ml/m ² . Tiempo de exposición: 15–60 min (15 min para eficacia bactericida y fungicida, 60 minutos eficacia esporicida y virucida). Ventilar adecuadamente la estancia tras su uso. Desinfección vía aérea: niebla húmeda (aerosol; Sanosil easy fog; 80ml/m ² ; tiempo de contacto: 15–60 min) o niebla seca (nebulización; sanosil Q-jet; 6–14ml/m ² ; tiempo de contacto: 120–240 min) Dejar secar y aclarar las superficies tratadas previo uso Aplicar el producto con una mopa o bayeta aséptica de manera homogénea por toda la superficie, asegurándose de que esta permanezca humedecida con el producto durante al menos 5 minutos. No precisa aclarado Limpiar la superficie a desinfectar con una toallita o paño de un solo uso impregnado en el producto y dejar secar. No rociar directamente en las ranuras de los dispositivos médicos. No precisa aclarado. Esperar a que el tiempo de contacto haya transcurrido Limpiar la superficie a desinfectar con una toallita o paño de un solo uso impregnado en el producto y dejar secar. No precisa aclarado. Esperar a que el tiempo de contacto haya transcurrido
Argaex Pirámide2006, S.L	1DT873 (pulverizador 1litro)	1316-DES	-	-	Bactericida Fungicida Levuricida Virucida total	- Alcohol etílico (etanol) 67,90% - Agua desionizada 32,10%	Listo para usar (Tiempo de contacto: al menos 5 min)	Desinfección de superficies lavables estables a alcoholes en el ámbito sanitario	
B. Braun Medical S.A.	Meliseptol Rapid (garrafa 5 l, pulverizador 750 ml)	507-DES	Envase pulverizador	750 ml	Bactericida Fungicida Levuricida Virucida limitada Micobactericida	- 1-propanol 5% - Cloruro de didecildimetilamonio 0,0075% - Excipientes: <5% surfactantes no iónicos	Listo para usar Bactericida, levuricida: 1 min Fungicida: 15 min Virucida: 10 min Micobactericida: 30 seg Listo para usar	Desinfectante rápido a base de alcohol de aparataje médico y superficies resistentes al alcohol	
B. Braun Medical S.A.	Meliseptol Foam Pure (garrafa 5 l, pulverizador 750 ml)	634-DES	Envase pulverizador	750 ml	Bactericida Fungicida Levuricida Virucida limitada Micobactericida	- Propanol 1,70% - Cloruro de didecildimetilamonio 0,023% - Excipientes: <5% surfactantes no iónicos	Listo para usar Bactericida, levuricida: 1 min (2 min en condiciones sucias) Fungicida: 60 min Virucida: 5 min Micobactericida: 1–3 min	Detergente y desinfectante a base de alcohol de aparataje médico y superficies resistentes al alcohol	

(Continúa)

Tabla 3 (Continuación)

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
Comercial Química Massó, S.A.	S.Q. Profesional Biocida Aldehídico (garrafa 10 y 20 l)	557-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida Esporicida	- Glutaraldehído 6,50% - Cloruro de benzalconio 2%	Dilución: 1% (10mL/L) al menos 20 min.	Desinfectante de superficies críticas y semicríticas de ámbito sanitario	Diluir 10 ml por cada litro de agua. Aplicar sobre la superficie y dejar actuar al menos 20 min
	Solquat Plus (envase 1 l, garrafa 5 y 20 l)	594-DES	Garrafa de 5 l y 20 l	-	Bactericida Fungicida Levuricida	- Cloruro de didecildimetilamonio 7,50% - Cloruro de benzalconio 5%	Dilución: 0,20–4% en función del tipo de contaminación a eliminar y el tiempo de contacto indicado (5–15min)	Desinfectante de superficies de ámbito hospitalario	Aplicar la solución de desinfectante con la ayuda de pulverizador, mopa, esponja, bayeta, etc. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos, en función de la dosis elegida, aclarar con agua y dejar secar. Si se utiliza el sistema de mopa húmeda, no precisa aclarado. La solución de desinfectante debe prepararse diariamente. Desechar la solución sobrante
	Solquat Total (garrafa 5 l)	855-DES	Garrafa 5 l	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida	- Cloruro de benzalconio 2,50% - Cloruro didecildimetilamonio 3,75%	Dilución: 0,08–5% en función del tipo de contaminación a eliminar y el tiempo de contacto indicado (5–15 min)	Desinfectante de superficies de ámbito hospitalario	Aplicar la solución de desinfectante escogida con la ayuda de pulverizador, mopa, esponja, bayeta, etc. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos, en función de la dosis elegida, aclarar con agua y dejar secar. Si se utiliza el sistema de mopa húmeda, no precisa aclarado. La solución de desinfectante debe prepararse diariamente. Desechar la solución sobrante
Davant Beauté S.L.	Solquat Quick (garrafa 5 l, botellas 750 ml)	886-DES	Garrafa 5 l y Botellas 750 ml	-	Bactericida Levuricida Virucida total	- Cloruro de didecildimetilamonio 0,75% - Alcohol	Listo para usar	Desinfección de superficies de ámbito hospitalario. Para desinfecciones rápidas, intermedias y localizadas	Aplicar con la ayuda de pulverizador. Mojar una zona extensa, secar con un trapo limpio, o limpiar con una mopa empapada con el producto y dejar secar. No precisa aclarado
	Solquat Premium (garrafa 5 l)	963-DES	Garrafa 5 l	-	Bactericida Fungicida Levuricida Micobactericida Esporicida Virucida	- Cloruro de didecildimetilamonio 6,50% - Triaminas 5,30%	Escoger la dilución apropiada en función de la contaminación	Desinfección de superficies duras en todo tipo de centros sanitarios. Para todo tipo de zonas: críticas y subcríticas	Extender el producto con la mopa húmeda, fregona o bayeta. Es necesario aclarar los suelos encerados o pulidos. En los demás casos, se puede aclarar o dejar secar al aire.
	Chlor-Clean Tabletts	1238-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida total Micobactericida Esporicida	- Cloro orgánico en forma de 1,70 g de Dicloroisocianurato de sodio (NaDCC) - Detergente	Cada tableta produce 1.000 ppm de cloro libre disponible cuando se agrega a 1 l de agua Tiempo de contacto: 5 min	Detergente-desinfectante de superficies de ámbito sanitario	La solución fresca de desinfectante debe prepararse a diario o más a menudo si se vuelve visiblemente sucia o diluida 1. Utilizar agua fría normal del grifo. 2. Medir los litros de agua necesarios de solución desinfectante. Añadir 1 tableta de Chlor-Clean por cada litro de agua, para un uso normal (1000 ppm). 3. Sin agitar bruscamente realizar 2 o 3 giros, invirtiendo suavemente el recipiente. 4. Aplicar utilizando una bayeta o toallita (verter el contenido en un cubo, sumergir la bayeta y escurrir), usando mocho o fregona para el suelo (verter el contenido en el cubo de fregar), o bien, en un spray para pulverizar sobre las

<p>superficies, usando una gamuza o toallita. 5. No precisa aclarado ni secado. Acción desinfectante en 5 min. 6. Desechar la solución sobrante tras su uso</p>				<p>Diversey España, S.L. Tasky Sprint H-200 (garrafa 5 l) 427-DES</p>
<p>• Aplicación SIN aclarado: utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del «doble cubo». Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1.º cubo) y una segunda pasada y escurrido para la desinfección (2.º cubo). Es recomendable que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. No precisa aclarado.</p> <p>• Aplicación CON aclarado: Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del «doble cubo». Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1.º cubo) y una segunda pasada y escurrido para la desinfección (2.º cubo). Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. Aclarar con abundante agua para eliminar los restos de producto. Para una mayor seguridad y eficacia, no entrar en el recinto desinfectado hasta transcurrido 1 h</p>	<p>Dilución: 0,25–1,50% Bactericida: 0,50% 5 min Fungicida: 1,50% 15 min Virucida: 0,50% 15 min</p> <p>Detergente- desinfectante de suelos y superficies de ámbito sanitario</p>	<p>- Cloruro de alquil-dimetil-bencilamonio-N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina</p>	<p>Bactericida Fungicida Virucida limitado</p>	
<p>limpieza y desinfección con pulverización: 1. Eliminar la suciedad suelta 2. Pulverizar sobre las superficies previamente impregnado con el producto 4. Pulverizar otra vez y dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida. Dejar secar.</p> <p>Limpiar y desinfección con cubo: 1. Eliminar la suciedad suelta 2. Aplicar la solución con mopa o bayeta 3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida. 4. Dejar secar al aire, para superficies de contacto pueden ser secadas con una mopa seca</p> <p>Pulverizar sobre las superficies. Limpiar con un paño limpio previamente impregnado con el producto. Dejar la superficie húmeda el tiempo de contacto requerido. Dejar secar</p>	<p>Dilución: 3.50% (35 ml/l) Bactericida y virucida: 5 min Fungicida: 15 min</p> <p>Detergente-desinfectante listo para usar sobre superficies duras no porosas del ámbito sanitario</p>	<p>- Peróxido de hidrogeno: 6,36% - Ácido salicílico: 2,50% - Ácido alquilo-bencenosulfónico - Excipientes</p>	<p>Bactericida Fungicida Virucida limitada</p>	<p>Oxivir H + (garrafa 5 l) 800-DES</p>
<p>Limpiar y desinfección con cubo: 1. Eliminar la suciedad suelta 2. Aplicar la solución con mopa o bayeta 3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida. 4. Dejar secar al aire, para superficies de contacto pueden ser secadas con una mopa seca</p> <p>Pulverizar sobre las superficies. Limpiar con un paño limpio previamente impregnado con el producto. Dejar la superficie húmeda el tiempo de contacto requerido. Dejar secar</p>	<p>Listo para usar Bactericida y virucida: 5 min Fungicida: 15 min</p> <p>Detergente desinfectante listo para usar sobre superficies duras no porosas del ámbito sanitario</p>	<p>- Peróxido de hidrogeno: 0,28% - Ácido salicílico: 0,11% - Excipientes</p>	<p>Bactericida Fungicida Virucida limitada</p>	<p>Oxivir H + spray (pulverizador 750 ml) 801-DES</p>

(Continúa)

Tabla 3 (Continuación)

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
	Oxivir H + JFLEX (pulverizador 1,5 l)	814-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Peróxido de hidrogeno: 6,36% - Ácido salicílico: 2,50% - Excipientes	Listo para su uso. El sistema de dosificación de J-Flex asegura un control total de consumo a través de una dilución automática que garantiza la dosificación correcta.	Detergente-desinfectante concentrado líquido para la limpieza y desinfección de todas las superficies duras resistentes al agua y la mayoría de mobiliario delicado del ámbito sanitario.	Girar el selector para dilución alta o baja (icono con menor o mayor densidad de pulverización) y llenar la botella pulverizadora o el cubo con la botella J-Flex. Ambas posiciones tienen la misma dilución a fin de garantizar la desinfección y una correcta dosificación. Limpieza y desinfección con pulverización: 1. Eliminar la suciedad suelta. 2. Pulverizar sobre las superficies, en una bayeta limpia y pasar la bayeta por la superficie o aplicar directamente sobre la superficie presionando el gatillo del cabezal espumante. 3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida. 4. Pasado el tiempo de contacto, volver a pasar la bayeta o dejar secar al aire. Limpieza y desinfección con cubo: 1. Eliminar la suciedad suelta. 2. Aplicar la solución con mopa o bayeta. 3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.	Surfanios Premium (autososificador 1 l, garrafa 5 l)	943-DES	-	-	Bactericida Levuricida Tuberculicida Virucida limitada	- N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (51 mg/g) - Cloruro de didecilmetilamonio (25 mg/g) - Excipientes	Dilución: 0,25% (2,5 ml/l) Bactericida: 15 min Levuricida: 30 min Tuberculicida: 60 min Virucida: 5 min Listo para usar Tiempo de contacto: entre 30 seg y 5 min, según eficacia requerida.	Detergente y desinfección de suelos y paredes	Diluir al 0,25% (20 ml por cada 8 l de agua a temperatura ambiente). Aplicar el producto diluido mediante mopa o bayeta aséptica. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. No precisa aclarado Pulverizar sobre las zonas a tratar hasta humedecerlas completamente. Dejar actuar entre 30 segundos y 5 minutos según la actividad antimicrobiana deseada. No precisa aclarado
	Aniospray Quick (pulverizador 1 l, garrafa 5 l)	997-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Tuberculicida Micobactericida Virucida limitada	Solución hidroalcohólica de Etanol 55%, propionato de amonio cuaternario, perfume	Listo para usar Tiempo de contacto: entre 30 seg y 5 min, según eficacia requerida.	Desinfectante alcohólico para superficies, equipos médicos y mobiliario	Pulverizar sobre las zonas a tratar hasta humedecerlas completamente. Dejar actuar entre 30 segundos y 5 minutos según la actividad antimicrobiana deseada. No precisa aclarado
	Surfa Safe Premium (pulverizador 750 ml)	1017-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Tuberculicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilmetilamonio 0,30% - N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropane-1,3-diamine	Listo para usar (Tiempo de contacto: entre 2 y 30 min, según eficacia requerida)	Detergente y desinfectante de superficies	Aplicar la espuma detergente desinfectante sobre la zona a tratar o preferentemente sobre un material no tejido. Repartir bien el producto. Dejar actuar entre 2 y 30 minutos en función de la actividad antimicrobiana deseada. No precisa aclarado. En caso de que el producto sanitario entre en contacto con piel o mucosas, aclarar con agua Pulverizar el producto directamente a una distancia de 30 cm sobre la superficie a desinfectar en una dosis recomendada de 8 pulverizaciones (10 ml/m ² , asegurándose de obtener una
Expert Lab Europe S.L.	DS 100 Rapid (pulverizador 750 ml, garrafa 5 l)	1383-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	- 2-Propanol 31% - Etanol 19% - Cloruro de benzalconio 0,26%	Listo para usar. Bactericida, Fungicida y Virucida en 1 min Fungicida en 5 min	Detergente-desinfectante de superficies de ámbito sanitario compatibles con alcohol	Pulverizar el producto directamente a una distancia de 30 cm sobre la superficie a desinfectar en una dosis recomendada de 8 pulverizaciones (10 ml/m ² , asegurándose de obtener una

Tabla 3 (Continuación)

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
José Collado S.A.	Limoseptol (garrafa 5 l válvula dosificadora opcional, sobres 50 ml, autodosisador 1 l)	47-DES	Garrafa 5 l c/v dosificadora		Bactericida Fungicida	- Glixol 3,40% - Glutaraldehído 1,25% - Cloruro de benzalconio 5% - Excipientes	Dilución: 1% (10 ml/l) (Tiempo de contacto: 5–15 min)	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas	Diluir 100 ml (4 puls/2 sobres) en 10 l de agua. Aplicar mediante sistema de un cubo/doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada. Dejar actuar 5–15 min
	Limoseptol Plus (Garrafa 5 l válvula dosificadora opcional, autodosisador 1 litro)	650-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilidimetilamonio 4,50% - Excipientes	Dilución: 1% (10 ml/l)	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas. Dispositivos médicos y productos sanitarios no invasivos	Diluir 100 ml (4 puls) en 10 l de agua. Aplicar mediante sistema de un cubo/doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada
	Limoseptol FA (garrafa 5 l válvula dosificadora opcional)	838-DES	Garrafa 5 l c/v dosificadora		Bactericida, Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilidimetilamonio 5% - N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 2,50% - Excipientes	Dilución: 0,50–2% Bactericida: 0,50% 5 min Levirucida, fungicida: 0,50% 15 min Virucida: 2% 5 min Listo para usar. Programar 6–10 min cada 100 m ³ del volumen a tratar en Aerobrumer® (si varios aparatos, reparar el tiempo total entre ellos) Listo para usar	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas. Dispositivos médicos y productos sanitarios no invasivos	Diluir 50–200 ml (2–8 pulsaciones) en 10 l de agua. Aplicar mediante sistema de un cubo/doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada
	F-66 (garrafa 10 l)	853-DES	Garrafa 10 l		Bactericida	- Cloruro de benzalconio 0,25% - Excipientes		Desinfectante vía aérea en caliente para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar mediante el termomicrodifusor Aerobrumer® tipo H en forma de aerosol seco y en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 3 h
	CR-36 Advanced (pulverizador 750 ml, garrafa 5 l)	1005-DES	Pulverizable 750 ml		Bactericida Fungicida Virucida limitada Micobactericida	- Cloruro de didecilidimetilamonio 0,11% - Isopropanol 41% - Excipientes		Desinfección de superficies en zonas críticas	Aplicación directa sobre la superficie de producto sanitario a tratar. Repartir homogéneamente con un paño limpio
	Limoseptol Advanced (garrafa 5 l válvula dosificadora opcional, autodosisador 1 l)	1167-DES	Garrafa 5 l c/v dosificadora		Bactericida Fungicida Levirucida Virucida total	- Cloruro de didecilidimetilamonio 13,80% - 2-Fenoxietanol 2,50% - Excipientes	Dilución: 1–2% Bactericida: 5 min Levirucida, fungicida: 15 min Virucida: 5–15 min Micobactericida: 5 min	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas	Diluir 100–200 ml (4–8 puls/2–4 sobres) en 10 l de agua Aplicar mediante sistema de un cubo/doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada. Dejar actuar según eficacia requerida
	Limoseptic Advanced (garrafa 5 l válvula dosificadora opcional, autodosisador de 1 l)	1401-DES	Garrafa 5 l c/v dosificadora		Bactericida Levirucida Fungicida Virucida limitada	- Peróxido de hidrógeno 7,50% - Etanol 9% - Excipientes	Dilución: 3% (30 ml/l) Bactericida y levirucida: 3% 5 min Fungicida y virucida: 3% 15 min	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas	Diluir 150 ml (6 pulsaciones) en 5 l de agua. Aplicar mediante sistema de un cubo/doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada. Dejar actuar según eficacia requerida

Laboratorios Bilper S.L.	Hospimed B-1 (garrafa 5 l, pulverizador 750 ml)	573- DES	-	Bactericida Fungicida	- Cloruro de didecilimidilammonio 1% - Etanol 10% - Propanol 50%	Listo para usar (Tiempo de contacto: 1–3 min)	Desinfectante rápido de utilaje y superficies de ámbito sanitario	Aplicar sobre la superficie a desinfectar y dejar actuar de 1–3 min. No precisa aclarado. Desinfección de recintos: plazo de seguridad: 1 h
	Hospimed BP-1 (pulverizador 750 ml)	1384- DES	Envase pulverizador 750 ml	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Etanol 75% - Cloruro de didecilimidilammonio 0,75%	Listo para usar (Tiempo de contacto: 5 min)	Desinfectante de superficies de ámbito sanitario neutro de uso directo	Aplicar sobre la superficie a desinfectar asegurándose de que permanezca humedecida durante 5 minutos. Pasado ese tiempo dejar secar al aire o retirar el exceso tras el tiempo de contacto con una bayeta o mopa aséptica. Se recomienda no entrar en el recinto hasta transcurridas 3 h, previa ventilación adecuada
	Hospimed B6 (envase 750 ml)	749- DES	-	Bactericida Fungicida Levuricida	- Cloruro de didecilimidilammonio 6% - Bis (3-aminopropyl)-dodecylamine 5,50% - Agua y excipientes	Dilución: 4% (40 ml/l) 15 min	Detergente-desinfectante de utilaje y superficies críticas de ámbito sanitario	Diluir 200 ml en 5 l de agua. Superficies: distribuir con bayeta o mopa aséptica y dejar actuar 15 min. Secar con bayeta o mopa aséptica. Utilaje: inmersión 15 min. Secar con bayeta o mopa aséptica.
	Hospimed BP7 (garrafa 5 l)	923- DES	Garrafa 5 l	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilimidilammonio 4,50% - Monoetanolamina 4,50%	Dilución: 5% (50 ml/l) 15 min	Desinfectante de superficies de ámbito sanitario	Desear la solución tras su uso Diluir 50 ml en 1 l de agua. Distribuir la solución formada, ayudándose de una mopa o bayeta limpia y aséptica por toda la superficie asegurándose de que esta permanezca humedecida con el producto durante el tiempo indicado (15 minutos). Se recomienda no entrar en el recinto desinfectado hasta transcurrida 1 h, ventilándose adecuadamente antes de entrar
	Hospimed BP4 (garrafa 5 l)	924- DES	Garrafa 5 l	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilimidilammonio 5% - Cloruro de benzalconio 5% - Monoetanomalina 4,95% Sin aldehídos ni formal	Dilución: 1,50–5% 15 min	Desinfectante de superficies de ámbito sanitario	Distribuir la solución formada, ayudándose de una mopa o bayeta limpia y aséptica por toda la superficie asegurándose de que esta permanezca humedecida con el producto durante el tiempo indicado (15 minutos). Se recomienda no entrar en el recinto desinfectado hasta transcurrida 1 h, ventilándose adecuadamente antes de entrar
	Hospimed BP6 (garrafa 5 l)	1013- DES	Garrafa 5 l	Bactericida Fungicida	- Cloruro de N-N-didecil-N-N- dimetilammonio 6% - Bis (3-aminopropyl)-dodecylamina 5,50%	Dilución: 4% (40 ml/l) Bactericida: 1–4% 5 min Fungicida: 4% 15 min	Desinfectante de superficies, equipos y materiales de ámbito sanitario	Aplicar mediante pulverización sobre las superficies y/o materiales a desinfectar, una vez diluido el producto, extendiendo el producto con una bayeta o mopa antiséptica y dejar secar alcohol.
Lohmann & Rauscher International GMBH	L+R Surfacedisinfect Alcohol Maxi Wipes (dispensador 110 toallitas impregnadas 38 × 20 cm) L+R Surfacedisinfect Alcohol Wipes (paquete 60 toallitas)	958- DES 957- DES	- -	Bactericida Levuricida Tuberculicida Mibobactericida, Virucida limitada	- Etanol 25g - 1-Propanol 24 g (por 100 g de solución)	Listo para usar. Area desinfectable: 1 m ² por toallita Bactericida, levuricida y tuberculicida/ mibobactericida: 1min Virucida: 30 segundos Listo para usar. Area desinfectable: 0,5 m ² por toallita	Desinfectante de superficies y dispositivos médicos no invasivos compatibles con alcohol	No apto para superficies sensibles al alcohol. Aplicar sobre la superficie a desinfectar y dejar actuar. No deja residuos. Sellar el envase tras su uso para evitar que se sequen

(Continúa)

Tabla 3 (Continuación)

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
	impregnadas 20 × 18 cm)								
	L+R Surfactedisinfect Alcohol Tissues (canister 100 toallitas impregnadas 22,5 × 13,8 cm)	955-DES					Listo para usar Área desinfectable: 0,20 m ² por toallita		
	L+R Surfactedisinfect Alcohol (botella 1 l)	959-DES					Listo para usar		
	L+R Surfactedisinfect Universal Maxi Wipes (dispensador 110 toallitas 38 × 20 cm)	951-DES	-		Bactericida Levuricida Virucida limitada	- Cloruro de alquil (C12–16) dimetilbencilamonio 0,40 g - Cloruro de didecil dimetilamonio 0,40 g (por 100 g de solución)	Listo para usar Área desinfectable: 1 m ² por toallita Bactericida, levuricida: 1 min Virucida: 30 seg (norovirus) - 1 min (polionavirus) Listo para usar Área desinfectable: 0,50 m ² por toallita	Desinfectante de superficies y dispositivos médicos no invasivos Apto para superficies sensibles al alcohol. Aplicar sobre la superficie a desinfectar y dejar actuar. No deja residuos. Sellar el envase tras su uso para evitar que se sequen	
	L+R Surfactedisinfect Universal Tissues (canister 100 toallitas 22,5 × 13,8 cm)	954-DES					Listo para usar Área desinfectable: 0,2 m ² por toallita		
	L+R Surfactedisinfect Universal Tissues (canister 100 toallitas 22,5 × 13,8 cm)	956-DES					Listo para usar Área desinfectable: 0,2 m ² por toallita		
Químicas Quimxel, S.L.	Micosan (garrafa 5 l)	792-DES	-		Bactericida Fungicida Levuricida Virucida Tuberculicida Esporicida	- Alcohol isopropílico 11,40% - Glutaraldehído 11,20% - Cloruro de didecil dimetilamonio 4% - Cloruro de benzalconio 5,30% - Coadyuvantes y disolventes	Dilución: 0,50–2,50%. Nivel bajo de desinfección: 1% (15 min) Nivel medio: 2,50% (60 min)	Desinfectante de todo tipo de superficies lavables del ámbito sanitario Realizar limpieza previa y trabajar a temperatura ambiente y en ausencia de personas. Aplicar con fregona o bayeta aséptica mediante la técnica del «doble cubo» con o sin aclarado final y secado al aire. Plazo de seguridad: 3 h (1 h si se aclara con agua), ventilando antes de entrar. Desechar la solución tras cada uso Aplicar con fregona o bayeta asépticas mediante la técnica del «doble cubo» dosificando a razón de 40–60 ml/l de agua.	
	Fresc San (garrafa 5 l)	821-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecil dimetilamonio 2,10% - Excipientes	Dilución: 4–6% (40 a 60 ml/l) (Virucida: 5%)	Detergente–desinfectante de superficies de ámbito sanitario	No precisa aclarado. Desechar la solución tras 24 h y siempre tras cada uso

Tabla 3 (Continuación)

Responsable de la puesta en el mercado	Denominación del producto	No DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
Tecymain S.L.	Bac-Tec Clinic (Botella 1 kg, garrafa 5, 10 y 25 kg)	1341-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida limitada	Amonio cuaternario Alcohol	Dilución: 0.50–2% (Virucida: 25–50%)	Desinfectante de superficies de ámbito clínico	Aplicar por pulverización, lavado, circulación o inmersión en aplicación con fregona, mopa o bayeta aséptica, con o sin aclarado posterior. Dejar actuar las soluciones del producto en contacto con las superficies al menos 5 min
Tesis Galicia S.L.	Hidrosan Surfáce (botes de 100, 250, 500 y 750 ml, botellas 1 l y garrafas 5 l)	1071-DES	-	-	Bactericida Fungicida Virucida limitada	- Etanol 70% - 2-fenoxietanol 2,10% -Cloruro de didecilmetilamonio 0,35% - Excipientes	Listo para usar (Tiempo de contacto: 1–5–15 min, según eficacia requerida)	Desinfectante hidroalcohólico de superficies de ámbito sanitario	Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Mantener el producto entre 1–5–15 minutos en contacto con la superficie, dependiendo de efecto deseado. En superficies muy sucias, realizar limpieza previa. Frotar y secar con una bayeta limpia aséptica. Desechar la solución empleada después de cada uso. No mezclar con ningún otro producto químico. Incompatible con agentes oxidantes, materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones
	Surgisoft_SF (botes 500 y 750 ml, botellas 1 l, garrafas de 5, 10, 20 y 25 l)	1146-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	-Cloruro de didecilmetilamonio 0,35% - Excipientes	Listo para usar (Tiempo de contacto: 1–5–15 min, según eficacia requerida)	Detergente desinfectante de superficies compatibles y lavables de ámbito sanitario	Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Aplicar mediante acción mecánica por fregado con la dilución de uso con trapo húmedo o toallita impregnada con la solución o bien, sin acción mecánica sobre las superficies. Mantener 1, 5 o 15 min en contacto con la superficie, en función del efecto deseado
	Optysan (garrafa de 5 l)	1241-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida total	- Cloruro de Benzalconio: 5% - Cloruro de didecilmetilamonio: 5%	Dilución: 1.50–5% Bactericida, levuricida: 1.50% 5 min Fungicida, virucida: 5% 15 min	Desinfectante concentrado de superficies compatibles en el entorno sanitario de contacto indirecto con el paciente	Aplicar diluido en agua mediante mopa o bayeta aséptica. Aclarar con agua potable limpia mediante la técnica del doble cubo. Secar con fregona, mopa o bayeta aséptica
	Surgisan RTU (botellas con tapón o envase pulverizador: 500 y 750 ml, botella con tapón: 1 y 1,5 l, garrafa de 5 l)	1519-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilmetilamonio: 0,44% - Alcohol Isopropílico: 4,06%	Listo para usar Bactericida, levuricida, virucida: 5 min Fungicida: 15 min	Desinfectante de superficies compatibles en el entorno sanitario de contacto indirecto con el paciente	Pulverizar sobre la superficie distribuyendo homogéneamente (30–40 ml/m ²) el producto puro sin diluir a temperatura ambiente garantizando su mojado. Dejar secar al aire o eliminar el exceso con una mopa o bayeta aséptica, respetando los tiempos de contacto
	Surgisan Q (botella con tapón: 1 y 1,5 l, garrafa de 5 l)	1520-DES	-	-	Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de didecilmetilamonio: 2,54% - Alcohol Isopropílico: 4,30%	Dilución: 15–20% Bactericida y levuricida: 15% 5 min Virucida: 20% 5 min	Desinfectante concentrado de superficies compatibles en el entorno sanitario de contacto indirecto con el paciente	Aplicar diluido en agua mediante mopa o bayeta aséptica. Aclarar con agua potable limpia mediante la técnica del doble cubo. Secar con fregona, mopa o bayeta aséptica

<p>Vesiamin S.L.</p>	<p>NDP Air Conditioning Plus (garrafa 10 l)</p>	<p>469-DES</p>	<p>--</p>	<p>Bactericida Fungicida Virucida limitada</p>	<p>- Cloruro de didecildimetilamonio 70% 0,46% - 2-Fenoxietanol 0,10% - Cinamaldehído 0,02% - Excipientes</p>	<p>Listo para usar Bactericida: 5 min Fungicida: 15 min Virucida: 1–15 min</p>	<p>Desinfección de superficies por vía aérea (nebulización), de superficies por contacto (aplicación directa), y de equipos y conductos de aire acondicionado (también en hospitales)</p>	<p>Desinfección de superficies: Aplicar el producto sobre la superficie por medio de una bayeta, de modo que la superficie quede impregnada, dejar actuar 5–15 minutos y enjuagar posteriormente. Desinfección ambiental: por microdifusión o nebulización. Se recomienda el uso de 1 l de producto por cada 150 m³ a desinfectar. Se recomienda un plazo de seguridad de 3 h en ausencia de personas, ventilándose antes de entrar en el recinto. Desinfección aire acondicionado: 1°) Limpieza: equipos impulsores, conductos, rejillas de impulsión, rejillas de retorno, bandeja de condensación. 2°) Desinfección - Conductos: 9 l/150 m², con intervalos de tiempo de 3 meses entre sucesivas aplicaciones - Filtros: la óptima aplicación por cada m² de filtro es de 300–500 ml con una frecuencia 1–3 meses. - Climatizadoras: dosificar según las superficies de las máquinas hasta conseguir su total impregnación, cada 3 meses. 3°) Ventilación: tras la aplicación del producto introducir aire limpio y poner en funcionamiento el sistema de ventilación, con reciclado de aire limpio durante 1 h</p>
----------------------	---	----------------	-----------	--	---	---	---	---

Tabla 4
 Productos biocidas con comercialización permitida hasta su inscripción en el Registro Oficial de Biocidas

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
Americo Govantes Burguete S.A. (Permitida comercialización hasta el 13 de octubre de 2024)	Desintop SF (garrafa 10 l)	94-DES	-		Bactericida Fungicida	- Glutaraldehído 2% - Disolventes y excipientes	Listo para usar	Desinfectante vía aérea de superficies críticas de ámbito sanitario	Aplicar sin diluir con el aparato microdifusor electrotérmico y en ausencia de personas. Aplicar 10 minutos de microdifusión por cada 100 m ³ de local a tratar. Plazo de seguridad: 24 h (ventilar la zona desinfectada tras su uso)
Aquactiva Solutions S.L.	Aquactiva Protect FOG (ámbito clínico) (garrafas 5, 10 y 20 l)	1382-DES	-		Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	- Cloruro de sodio 0,10% - Ácido hipocloroso 0,03% - Agua 99,87% Ingrediente activo: Cloro activo generado a partir de ácido hipocloroso	Listo para usar	Desinfectante de superficies de ámbito clínico por vía aérea mediante nebulización en frío	Desinfección ambiental mediante nebulización: - Aplicar la solución mediante un nebulizador en frío ULV H05, H10 H15 en modo 2-3 (tamaño de gota < 25 µ) para obtener una niebla seca. - Mantener las ventanas y puertas cerradas durante la nebulización y el tiempo de acción (60 min) - Ventilar la habitación y volver a entrar sin esperar plazo de seguridad. - Dosis orientativa: 2 l/100 m ³
	Aquactiva Protect (ámbito sanitario/clínico) (spray 1 l, garrafas 5, 10 y 20 l)	1379-DES					Listo para usar Bactericida, levuricida: 5 min Virucida: 1 min Fungicida: 30 min	Desinfectante de superficies de ámbito clínico	Desinfección de contacto: - Desinfección en spray o en paño: aplicar uniformemente sobre toda la superficie y sobre los objetos limpios hasta la formación de una película húmeda y uniforme. - Pulverizar o pasar una fregona/paño cubriendo toda la superficie, dejar actuar según eficacia requerida. - No precisa aclarado
Comercial Noble S.L.	Nieves N Clinic-81 (garrafa 5 l)	895-DES	-		Bactericida Fungicida	- Hipoclorito sódico (cloro activo) 5,52% - Excipientes	Dilución: Bactericida: 0,50–1% 5 min (1–2% en condiciones sucias) Fungicida: 0,50–1% 15 min (1–5% en condiciones sucias)	Detergente desinfectante para superficies del ámbito sanitario resistentes al hipoclorito sódico	Desinfección de superficies: 1. Realizar una limpieza previa de la zona a desinfectar. 2. Preparar una solución acuosa según la zona a tratar. Utilizar esta disolución una única vez. 3. Con ayuda de un paño bien aséptico humedecido en la anterior solución, limpiar las paredes en sentido descendente y continuar con las superficies horizontales. Terminar por el fregado

Tabla 4 (Continuación)

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
Diversey España, S.L.	Oxivir Excel H+ (garrafa 5 l)	911-DES	-		Bactericida Levuricida Virucida total	- Peróxido de hidrógeno: 7,20% - Ácido alquilbencenosulfónico 19,40% - Excipientes	Dilución: Bactericida y levuricida: 1,50% 5 min Virucida: 2% 5 min	Detergente desinfectante para la desinfección de superficies duras en el entorno hospitalario	de los suelos mediante la técnica del doble cubo y realizar el fregado en zig-zag, procurando que las superficies permanezcan húmedas al menos 15 minutos. Dejar secar sin enjuagar. Aplicar en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 3 h (ventilar la zona desinfectada tras su uso) Desinfección con bayeta y cubo: 1. Eliminar la suciedad suelta. 2. Aplicar el producto sobre la superficie 3. Dejar actuar el producto el tiempo necesario de contacto
	Oxivir Excel Foam H+ (pulverizador 750 ml)	914-DES	-		Bactericida Levuricida Virucida total	- Peróxido de hidrógeno 0,36% - Excipientes	Listo para usar Bactericida y levuricida en 5 min Virucida en 30 seg	Detergente-desinfectante de superficies y aparatos médicos no invasivos	1. Eliminar la suciedad suelta. 2. Aplicar en las superficies, en una bayeta limpia y pasar la bayeta por la superficie o aplicar directamente sobre la superficie presionando el gatillo del cabezal espumante. 3. Pasado el tiempo necesario de contacto, volver a pasar la bayeta o dejar secar al aire.
	Tasky Sprint H-100 (garrafa 5 l)	482-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida limitada Esporicida	- Hipoclorito de sodio - Alquildimetilaminas C12–14 - N-óxidos	Dilución: - Zonas de riesgo bajo/medio; 2–4 pulsaciones (60–120 ml) en 10 l de agua - Zonas críticas: 4–8 pulsaciones (120–240 ml) en 10 l de agua Para actividad fungicida/virucida; incrementar dosis hasta 5% (4450 ppm Cl2)	Detergente-desinfectante clorado para superficies de ámbito sanitario	Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del «doble cubo». Diluir el producto según dosificación recomendada. Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa y una segunda pasada para la desinfección. Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. No precisa aclarado
Ecolab Hispano Portuguesa S.L.	Instrunet Aseptanios AD (garrafa 5 l)	944-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida Esporicida	- Solución estabilizada de ácido peracético (± 1200 ppm) y peróxido de hidrógeno	Listo para usar 7 ml/m ³	Desinfectante vía aérea en caliente para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar por aeronebulización a 55 °C de temperatura. 1. Insertar el bidón en le Aereosept® 500 2. Colocar en la esquina de una habitación previamente limpia 3. Ajustar la programación calculando el volumen a tratar 4. Activar el equipo y salir de la habitación 5. Usar una mascarilla FFP3 para entrar en la

(Continúa)

Tabla 4 (Continuación)

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
Jose Collado S.A.	Daroclor -80 (garrafa 5 l válvula dosificadora opcional)	48-DES	Garrafa 5 l C/V dosificadora		Bactericida Fungicida Virucida limitada Esporicida	- 80 g/l de cloro disponible - Excipientes	Dilución: Bactericida: 1–2% 5 min Levuricida y fungicida: 1% 15 min Virucida: 3% 15 min Esporicida: 1% 30–60 min	Detergente-desinfectante de superficies en zonas críticas	habitación y ventilar antes de volver a utilizarla Diluir 50–300 ml (2–12 pulsaciones) en 10 l de agua. Aplicar mediante sistema de un cubo/ doble cubo, o fregado manual con bayeta aséptica o mopa preimpregnada
	F-66 SR (garrafa 5 l)	620-DES	Garrafa 5 l		Bactericida Fungicida Virucida limitada Esporicida Micobactericida	- Peróxido de hidrógeno 8% - Excipientes	Listo para usar. Programar 18 min (Aeroturbex®)/ 36 min (Nouvair®) cada 100 m ³ del volumen a tratar (si varios aparatos, repartir el tiempo total entre ellos)	Desinfectante vía aérea en frío para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar con el microdifusor molecular y neumático Aeroturbex® (grandes volúmenes) Nouvair® (pequeños volúmenes), en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 3 h.
	R-410 (garrafa 10 l)	42-DES	Garrafa 10 l		Bactericida	- Clorocresol 0,50% - Excipientes	Listo para usar. Programar 10 min cada 100 m ³ del volumen a tratar en Aerobrumer® (si varios aparatos, repartir el tiempo total entre ellos)	Desinfectante vía aérea para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar mediante el termomicrodifusor Aerobrumer® tipo H en forma de aerosol seco y en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 3 h
	Terminal Forte SR Garrafa 5 l (A) + potenciador (B)	619-DES	Garrafa 5 l		Bactericida Fungicida Levuricida Esporicida Micobactericida Virucida limitada	- Solución A: peróxido de hidrógeno 8,50%, alcohol isopropílico 10,50%, excipientes. - Solución B: Ácido peracético 5%, peróxido de hidrógeno 20%, ácido acético 10%, excipientes. Mezcla A + B: peróxido de hidrógeno 9%, ácido peracético 0,25%, excipientes	Listo para usar. Programar 18 min (Aeroturbex®)/ 36 min (Nouvair®) cada 100 m ³ del volumen a tratar (si varios aparatos, repartir el tiempo total entre ellos)	Desinfectante vía aérea en frío para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Mezclar A + B y aplicar con el microdifusor molecular y neumático Aeroturbex® (grandes volúmenes) Nouvair® (pequeños volúmenes), en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 4 h. Estabilidad de la mezcla A + B activada: 30 días
	Total Shock SF (garrafa 10 l)	613-DES	Garrafa 10 l		Bactericida Fungicida Virucida total	- Glutaraldehído 2,50% - Excipientes	Listo para usar. Programar 12 min cada 100 m ³ del volumen a tratar en Aerobrumer® (si varios aparatos, repartir el tiempo total entre ellos)	Desinfectante vía aérea en caliente para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar mediante el termomicrodifusor Aerobrumer® tipo H en forma de aerosol seco y en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 6 h
Laboratorios Bilper S.A.	Total Shock SR (Nouvair: garrafa 2 l/ Aeroturbex: garrafa 10 l)	532-DES	Garrafa 2 y 10 l		Bactericida Fungicida	- Glutaraldehído 2,50% - Excipientes	Listo para usar. Programar 12 min (Aeroturbex®)/ 24 min (Nouvair®) cada 100 m ³ del volumen a tratar (si varios aparatos, repartir el tiempo total entre ellos)	Desinfectante vía aérea en frío para la desinfección de mantenimiento de instalaciones	Aplicar con el microdifusor molecular y neumático Aeroturbex® (grandes volúmenes) Nouvair® (pequeños volúmenes), en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 12 h
	Bacterisan Colorado (garrafa 5 l)	784-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida	- Hipoclorito 5% (60g/l cloro activo) - Hidróxido sódico 2,50% - Óxido de dimetilmiristilamina - Disolventes y excipientes	Dilución: 5% (50 ml/l)	Detergente-desinfectante clorado de superficies de ámbito sanitario	Aplicar de manera manual y por pulverización, previamente diluido en agua y ayudándose de una bayeta, mopa o fregona aséptica para asegurarse que el producto quede bien esparcido. Dejar secar (no precisa aclarado)
Laboratorios Vaza S.L.	Visclean hipocloroso	1340-DES	-		Bactericida Levuricida	- Cloro activo liberado a partir de ácido	Listo para su uso	Desinfectante de superficies	Pulverización con pulverizador de gatillo o

Tabla 4 (Continuación)

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
	(pulverizador 500 ml)				Virucida limitada	hipocloroso por electrolisis 0,02% - Excipientes		hospitalarias	pulverizador electrostático con capacidad hasta 1 l y bayeta con el producto puro, respetando los tiempos de contacto. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Aclarar con agua de consumo las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con las personas. Ventilar adecuadamente tras la realización del tratamiento de desinfección. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con: ácidos y bases fuertes
Prominent Chemical S.L.	Net Clor (envase 1 l, garrafa 5 l)	981-DES	-		Bactericida Fungicida	- Hipoclorito sódico (cloro activo): 14% - Excipientes	Dilución: Bactericida: 6% 5 min Fungicida: 10% 15 min	Detergente desinfectante clorado de superficies	Desinfección por contacto: manual (paño o fregona), pulverización e inmersión con el producto diluido en agua. No mezclar con ningún otro producto químico. Incompatible con ácidos, compuestos nitrogenados y metales
Químicas Quimxel S.L.	Clorsan (envase 1 l, garrafa 5 l)	787-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida Esporicida	- Hipoclorito sódico 5% (50 g/l de cloro activo) - Hidróxido sódico 0,35% - Coadyuvantes y agua	Dilución: Bactericida y fungicida: 2% 5 min Virucida: 1,50% 15 min Esporicida: 2,50% 60 min Dosificador envase 5 l: 30 ml Tapón dosificador envase 1 l: 20 ml	Detergente-desinfectante clorado de todo tipo de superficies lavables en el ámbito sanitario	Se recomienda trabajar a temperatura ambiente y en ausencia de personas. Aplicar con fregona o bayeta en condiciones limpias o asépticas mediante la técnica del «doble cubo» y dejar actuar el tiempo necesario según la eficacia requerida. No precisa aclarado. Realizar limpieza previa. No entrar en el recinto hasta transcurridas 3 h. Desechar la solución tras cada uso
S.A. Proder	Sanit Desinfect (garrafa 5 l)	563-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida	- Hipoclorito sódico 7% (80 g/l cloro activo) - Hidróxido sódico 1% - Tensioactivos y secuestrantes	Dilución: 0,25–6,50% según eficacia requerida	Detergente-desinfectante clorado para superficies de ámbito sanitario	Aplicar el producto diluido con bayeta o fregona, dejar actuar. No precisa aclarado
	Sanit Total DVF (garrafa 5 l)	629-DES	-		Bactericida, Fungicida Esporicida	- Glutaraldehído 2,50% - Alcohol isopropílico 5%	Listo para usar	Desinfectante vía aérea por nebulización en frío de zonas críticas y semicríticas	Se aplica puro, mediante en nebulizador en frío FORTEXAIR. Poner en marcha el equipo, marcando los metros cúbicos de la sala a tratar en el display. El aparato dosificará automáticamente a razón de 1 l/h. Para otros nebulizadores en frío, que funcionen por tiempo, aplicar de 12 a

(Continúa)

Tabla 4 (Continuación)

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
S.Q. Futurquímica S.L.U.	Clorosol Gel (garrafa 5 l)	577-DES	-		Bactericida Fungicida Levuricida Virucida total Esporicida	- Hipoclorito sódico 7,50%	Dilución: Bactericida: 3% 5 min Fungicida: 8% 5 min Levuricida: 2% 5 min Virucida: 3% 15 min Esporicida: 5% 60 min	Detergente-desinfectante alcalino clorado de superficies de ámbito sanitario	18 minutos por cada 100 m ² . No necesita aclarado. Aplicar sobre la superficie a limpiar y desinfectar, dejar actuar el tiempo necesario según la eficacia requerida y aclarar con agua. Para una acción esporicida y virucida, limpiar previamente la superficie a desinfectar y dejar actuar durante el tiempo especificado. Si se utiliza el sistema de mopa húmeda no precisa aclarado.
Soro Global S.A.	Clorgel (garrafa 2 y 5 l)	551-DES	-		Bactericida Fungicida Virucida	- Hipoclorito sódico solución 4,18% - Hidróxido de sodio <3% - N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina <2,50%	Dilución: 2% (20 ml/l)	Detergente-desinfectante clorado de suelos y superficies sanitarias de ámbito clínico	Añadir 50 a 200 ml en un cubo de 10 l de agua, según grado de suciedad y extender sobre la superficie a limpiar con fregona, bayeta o cepillo. La temperatura normal de empleo es de 20 °C, pudiendo aumentarse hasta los 60 °C, sin pérdida de propiedades
Suministros Científico Técnicos S.A.	Aquagen SDF Clinic (garrafa 5 l)	719-DES	-		Bactericida Fungicida	- Hipoclorito sódico 7,80% (cloro activo) - Excipientes	Dilución: Bactericida y fungicida: 1% 15 min	Desinfectante clorado de superficies lavables de ámbito sanitario	Diluir 10 ml por cada litro de agua. Superficies: aplicar con paño húmedo y dejar actuar durante el tiempo necesario según la eficacia requerida. Aclarar con agua y secar. Suelos: utilizar fregona o mopa de microfibra, aclarar con agua y secar. Estabilidad de la solución: 8 h Aplicar en ausencia de personas. Plazo de seguridad: 1 h
Tesis Galicia S.L.	Gut-Saniclor (botellas 1 l, garrafas 5 y 25 l)	912-DES	-		Bactericida Fungicida	- Hipoclorito sódico 5,20% - Excipientes	Dilución: Bactericida: 3,50% 5 min Fungicida: 3,50% 15 min	Detergente desinfectante clorado de superficies compatibles del ámbito sanitario	Añadir 35–45 ml por cada litro de agua (3,50–4,50%). Aplicar mediante fregona o bayeta limpia y aséptica. Mantener el producto entre 5–15 minutos en contacto con la superficie, dependiendo del efecto deseado. En superficies muy sucias, realizar una limpieza previa. Dejar secar. No precisa aclarado. Ventilar adecuadamente.
	1-210 (botellas 1 l, garrafas 5 y 25 l)	913-DES	-		Bactericida Fungicida	- Hipoclorito sódico 5,20% - Excipientes	Dilución: Bactericida: 3,50% 5 min Fungicida: 3,50% 15 min	Detergente desinfectante clorado de superficies compatibles del ámbito sanitario	Añadir 35–45 ml por cada litro de agua (3,50–4,50%). Aplicar mediante fregona o bayeta limpia y aséptica. Mantener el producto entre 5–15 minutos en contacto con la superficie, dependiendo

Tabla 4 (Continuación)

Responsable de puesta en el mercado	Denominación del producto	N° DES	Presentación estéril		Eficacia declarada	Composición	Dosificación	Indicaciones	Modo de empleo
			Envase	Contenido					
	APX-S 10 (botella 1 l, garrafa 5 l y 25 l)	942-DES	-		Bactericida Levuricida Fungicida Virucida limitada	- Ácido peracético 0,95% - Peróxido de hidrógeno	Dilución: Bactericida: 5% 5 min Levuridida: 0,50% 15 min Fungicida: 15% 15 min Virucida: 1% 5 min	Desinfectante de alto nivel para todo tipo de superficies compatibles y lavables del ámbito sanitario	del efecto deseado. En superficies muy sucias, realizar una limpieza previa. Dejar secar. No precisa aclarado. Ventilar adecuadamente. Desechar la solución empleada tras su uso Diluir 50 ml en 1 l de agua (5%) a temperatura ambiente. Para desinfección de superficies, emplear fregona o bayeta limpia y aséptica. Mantener el producto entre 5–15 min en contacto con la superficie, dependiendo del efecto deseado. Otros efectos antimicrobianos pueden variar entre 100–10.000 ppm y entre 5–60 min de acción, por contacto directo. En superficies muy sucias, realizar una limpieza previa. En recintos desinfectados, ventilar adecuadamente y no entrar hasta transcurrida 1 h. Desechar la solución empleada después de cada uso
Vestilab CRC S.L.U. (ahora Alsico Iberia S.L.)	Dec-Spore 300 Plus	940-DES	-		Bactericida Fungicida	- Ácido peroxiacético 5,13% - Peróxido de hidrógeno 21,70% - Excipientes	Dilución 1:200 5–15 min	Desinfección de superficies del ámbito sanitario	Preparar la solución desinfectante agregando 100 ml de producto a 20 l de agua potable o la dilución equivalente (1:200). Aplicar con fregona o bayeta limpia y aséptica. Mantener el producto entre 5–15 min en contacto con la superficie, dependiendo del efecto deseado. Enjuagar con agua esterilizada

Desinfección de superficies sin acción mecánica: EN 13727 (bactericida), EN 13697 (bactericida, levuricida y fungicida*), EN 13624 (levuricida y fungicida*), EN 14348 (tuberculicida* y micobactericida*), EN 14476 (virucida*).

Desinfección de superficies con acción mecánica: EN 13727 (bactericida), EN 13624 (levuricida y fungicida*), EN 14348 (tuberculicida* y micobactericida*), EN 14476 (virucida*).

La norma EN 13727 selecciona como organismos para determinar la actividad bactericida, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* y *Enterococcus hirae*.

La norma EN 13697 selecciona como espectro mínimo de microorganismos de ensayo para determinar la actividad bactericida, 4 bacterias (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Enterococcus hirae*) y para determinar la actividad fungicida, 2 hongos (*Candida albicans* [*C. albicans*]) y *Aspergillus brasiliensis*). También se puede determinar la actividad levuricida, únicamente con *C. albicans*.

La norma EN 13624 selecciona *Aspergillus brasiliensis* y *C. albicans* para determinar el espectro de actividad fungicida y *C. albicans* para determinar el espectro de actividad levuricida.

La norma EN 14348 selecciona dos microorganismos de obligado ensayo para la actividad micobactericida (*Mycobacterium avium* y *Mycobacterium terrae*) y un organismo obligado para la actividad tuberculicida (*Mycobacterium terrae*).

En cuanto a la actividad virucida, es importante tener en cuenta si el desinfectante de superficies presenta actividad virucida total o limitada. La norma EN 14476 se ensaya frente a 3 virus: poliovirus tipo 1, adenovirus tipo 5 y norovirus murino. En caso de que el producto demuestre eficacia virucida frente a estos 3 virus, se podrá reivindicar «actividad virucida total», lo que significa que el producto es eficaz frente a todo tipo de virus. Sin embargo, si un producto supera los ensayos solo para norovirus y adenovirus, pero no para poliovirus, se le atribuye «actividad virucida limitada», lo que equivale a decir que presenta eficacia frente a

todo tipo de virus con envoltura, más adenovirus, norovirus y rotavirus. Así mismo, existe también la opción de realizar el ensayo frente a virus encapsulados (virus *vaccinia Ankara* (MVA-BN), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus influenza A H1N1, etc.) lo que permitirá reivindicar solamente «actividad virucida limitada frente a virus con envoltura». Cualquier producto con «actividad virucida total», «actividad virucida limitada» o «actividad virucida limitada frente a virus con envoltura» según la norma EN 14476 es eficaz para virus encapsulados, como el caso de todos los virus de la familia del *Coronavirus* y, en concreto, el SARS-CoV-2.

La mayoría de los productos biocidas autorizados o en periodo transitorio revisados en este estudio reivindican actividad bactericida, virucida y fungicida. Sin embargo, apenas un 20% presentan actividad micobactericida/tuberculicida o esporicida, lo que puede limitar la selección del desinfectante a utilizar o tener que disponer de más de un agente biocida para cubrir el espectro deseado. Además, a la hora de seleccionar el agente biocida a utilizar, es importante solicitar al proveedor el ensayo de eficacia correspondiente de acuerdo con las Normas UNE-EN descritas, puesto que no todas las fichas técnicas las contemplan.

En cuanto al tiempo de contacto, Rutala y Weber^{12,16} destacan la importancia de este aspecto para garantizar la eficacia declarada por el fabricante y conseguir una desinfección completa de la superficie. Tiempos de contacto cortos garantizan que se alcance el efecto deseado antes del secado o de la eliminación del producto. El tiempo de acción ha de ser siempre inferior al tiempo de secado, lo que va a depender de la amplitud de la superficie tratada y de la formulación del producto (las soluciones acuosas y la inclusión de surfactantes alargan el tiempo de secado, mientras que las soluciones que contienen alcohol, lo acortan).

En cuanto al modo de empleo, los autores recomiendan tener en cuenta: el olor del producto, la estabilidad (concentrado y de la dilución), la solubilidad, la simplicidad de uso, la comercialización en diferentes formatos, así como formulaciones con propiedades limpiadoras que permitan aunar limpieza y desinfección en un solo paso. En este sentido, los agentes biocidas revisados en este estudio que se presentan listos para usar van a influir positivamente en su uso correcto, mientras que los que reivindican acción detergente adicional a la acción desinfectante, van a permitir evitar el uso de productos adicionales en situaciones en las que el grado de suciedad no sea excesivo. Sin embargo, es necesario destacar que en situaciones de suciedad excesiva siempre será necesaria una limpieza previa a la desinfección, ya que la presencia de materia orgánica puede inhibir químicamente la plena eficacia del desinfectante.

Otros aspectos que el usuario debe tener en cuenta a la hora de adquirir un agente biocida son la formación y soporte técnico ofrecidos por el proveedor, los costes totales, tanto directos como indirectos (reducción de infecciones nosocomiales) y la posibilidad de estandarización; cuantas menos formulaciones diferentes disponibles en el centro, menor será el riesgo de confusión y mayor el cumplimiento de las instrucciones del fabricante.

Una de las limitaciones de este estudio es que no contempla la seguridad como aspecto clave necesario a la hora de seleccionar el desinfectante de superficies idóneo, por lo que los lectores deberán consultar la ficha de seguridad del producto y escoger el producto con la menor toxicidad posible para los usuarios, pacientes y visitantes, con la menor inflamabilidad, con el menor número de equipos de protección personal (EPI) necesarios para su manejo y con la máxima compatibilidad con las superficies a desinfectar.

Pese al amplio número de agentes biocidas autorizados, aprobados o en periodo de transición, la selección del desinfectante de superficies más adecuado no es un proceso sencillo, ya que no todos ellos cumplen con todos los aspectos mencionados en esta revisión. Por este motivo, se recomienda priorizar aspectos relacionados con la eficacia, la seguridad y la facilidad de uso, así como acompañar el proceso de selección con la implementación de programas optimizados destinados a reducir la

transmisión de patógenos desde las superficies a los pacientes y al personal sanitario.

Responsabilidades éticas

Que se han tenido en cuenta las instrucciones para el envío de manuscritos y las responsabilidades éticas y, entre ellas, que todos los autores firmantes cumplen los requisitos de autoría y que todos han declarado no poseer conflicto de intereses

Las personas firmantes aceptan la responsabilidad definida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (disponible en <http://www.icmje.org/> y en Farmacia Hospitalaria).

Financiación

Los autores declaran que no han recibido financiación para la elaboración de este trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses.

Agradecimientos

A los compañeros del Grupo de Productos Sanitarios (GPS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) que contribuyeron a la elaboración del documento de consulta que se elaboró en 2011 y que se actualizó en 2017 y que ha sido la fuente de inspiración para este manuscrito.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Isabel Romero Crespo: Writing – original draft, Validation, Supervision, Methodology, Formal analysis. **María Luisa Gaspar Carreño:** Writing – original draft, Validation, Supervision, Project administration, Methodology, Data curation. **María Cristina Muñoz Contreras:** Validation, Methodology, Conceptualization.

Bibliografía

- Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2011;32(7):687–699. <https://doi.org/10.1086/660363>.
- Otter JA, Yezli S, Salkeld JAG, French GL. Evidence that contaminated surfaces contribute to the transmission of hospital pathogens and an overview of strategies to address contaminated surfaces in hospital settings. *Am J Infect Control.* 2011;41(5 Suppl):S6–S11. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2012.12.004>.
- van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. *N Engl J Med.* 2020;382(16):1564–1567. <https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973>.
- Kanamori H, Rutala WA, Weber DJ. The role of patient care items as a fomite in healthcare-associated outbreaks and infection prevention. *Clin Infect Dis.* 2017;65(8):1412–1419. <https://doi.org/10.1093/cid/cix462>.
- Suleyman G, Alangaden G, Bardossy AC. The role of environmental contamination in the transmission of nosocomial pathogens and healthcare-associated infections. *Curr Infect Dis Rep.* 2018;20(6):1. <https://doi.org/10.1007/s11908-018-0620-2>.
- Donskey CJ. Does improving surface cleaning and disinfection reduce health care-associated infections? *Am J Infect Control.* 2013;41(5 Suppl):S12–S19. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2012.12.010>.
- Reglamento (UE) no. 528/2012 del parlamento Europeo y del consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

8. Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
9. Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
10. AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [página Web]; 31/12/1997 [13/04/2024]. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/biocidas-y-cuidado-personal/biocidas-aemps/>.
11. Ministerio de Sanidad [página Web]; [consultado 13 Abr 2024]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/BiocidalFees.htm>.
12. Recomendaciones para la desinfección y esterilización de los materiales sanitarios. Plan Nacional de resistencia a antibióticos. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [consultado 18 Ene 2025]. Disponible en: https://www.resistenciaantibioticos.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_desinfeccion_y_esterilizacion_materiales.
13. Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de Farmacia Hospitalaria” publicada por el ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 2024. [consultado 18 Ene 2025]. Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/GuiaBPP3.pdf>.
14. Boletín informativo grupo Farmacotecnia de la SEFH. Volumen 4. No. 2 MAYO – AGOSTO 2014. [consultado 18 Ene 2025]. Disponible en: [BOLETIN_2_2014_final.pdf](#).
15. Hernández-Navarrete MJ, Cellorio Pascual JM, Lapresta Moros C, Solano Bernad V-M. Fundamentos de antisepsia, desinfección y esterilización. *Enferm Infect Microbiol Clin*. 2014;32(10):681–688.
16. Rutala WA, Weber DJ. Selection of the ideal disinfectant. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2014;35(7):855–865. <https://doi.org/10.1086/676877>.
17. Kang J, Sickbert-Bennett EE, Brown VM, Weber DJ, Rutala WA. Relative frequency of healthcare-associated pathogens by infection site at a university hospital from 1980–2008. *Am J Infect Control*. 2012;40(5):416–420. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.06.013>.
18. Sievert DM, Ricks P, Edwards JR, Schneider A, Patel J, Srinivasan A, et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) Team and participating NHSN facilities. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the centers for disease control and prevention, 2009–2010. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2013;34(1):1–14. <https://doi.org/10.1086/668770>.
19. Valdés CB, Criado Álvarez JJ, del Cura Bilbao A, Julvez TG, Pérez AMH, García IH, et al. Guía de uso de desinfectantes en el ámbito sanitario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. *REMPSP*. 2019;XXIV(4):17–81. Disponible en <https://www.sempspgs.es/es/68-Revista-Digital>.
20. Rutala WA, Weber DJ. Healthcare infection control practices advisory committee. Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities; 2008. [consultado 12 Ene 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/disinfection-sterilization/updates.html>.